

Género Tapinoma
Linneo, 1758

Clave a Especies
(Obreras)

©Kiko Gómez & Xavier Espadaler

<u>Tapinoma</u> (1)	
<p>Bicoloreadas. Gastro, patas, antenas y clípeo de color amarillo muy pálido, casi blanco. El resto de color castaño. Tamaño menor de 3 mm.</p>	<p>Unicoloreadas, de castaño claro a negro. Tamaño variable</p>
 <p>0.5 mm</p>	 <p>1 mm</p>
<p>melanocephalum</p>	<p>erraticum, madeirense, nigerrimum, pygmaeum, simrothi, sp1 ▶ (2)</p>
<u>Tapinoma</u> (2)	
<p>Tamaño uniforme menor de 3 mm. Clípeo no emarginado</p>	<p>Tamaño mayor. Clípeo emarginado en su borde anterior en mayor o menor medida</p>
	
<p>pygmaeum</p>	<p>erraticum, madeirense, nigerrimum, simrothi, sp1 ▶ (3)</p>
<p>Anterior (1) ◀</p>	

Tapinoma (3)

En vista frontal, uniendo el par de quetas erectas del clípeo con una línea, el extremo superior de la emarginación queda claramente por debajo de la línea, normalmente a una distancia que es aproximadamente la mitad entre la línea y el borde anterior del clípeo

Emarginación mas profunda, con el extremo superior de la emarginación alcanzando o superando claramente dicha línea



[madeirense](#)

[erraticum](#), [nigerrimum](#), [simrothi](#), [sp1](#) ▶ (4)

Anterior (2) ◀

Tapinoma (4)

La emarginación es de forma semicircular y tangente a la línea existente entre las dos quetas erectas del clípeo

La emarginación es de forma alargada y sobrepasa la línea existente entre las dos quetas erectas del clípeo



[erraticum](#)

[nigerrimum](#), [simrothi](#), [sp1](#) ▶ (5)

Anterior (3) ◀

Tapinoma (5)

Color castaño anaranjado



[sp1](#)

Color de castaño oscuro a negro




[nigerrimum](#), [simrothi](#) ▶ (6)

Anterior (4) ◀

Tapinoma (6)

Emarginación más elongada, relativamente estrecha y profunda (índice $a/b > 1,8$). Los bordes suelen ser rectos y divergentes



[simrothi](#)

Emarginación relativamente ancha y profunda (índice $a/b < 1,5$). Bordes rectos y paralelos



[nigerrimum](#)

Anterior (5) ◀